

impralit-KDS-4

Comercializado por: FROSCHÉMIE WOOD PROTECTION, S.L.

Tel.: + 34 937 131 663 · info@froschemie.com · C/ Pintor Vila Cinca, 18A · 08213 POLINYÀ (BARCELONA) · ESPAÑA

Fabricado/Registrado por: RÜTGERS Organics GmbH · Oppauer Straße 43 · 68305 Mannheim · DEUTSCHLAND

Número de Registro Ministerio de Sanidad: 23-80-05101

USO INDUSTRIAL

Finalidad: Tratamiento de la madera.

Tipo de formulación: Líquido.

Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

PELIGRO



Composición cuantitativa

de ingredientes activos:

Hidroxicarbonato de cobre	10,00 %
Ácido bórico	4,00 %
Borato de didecil polioxetilamonio	5,00 %
Disolvente y excipientes csp.	100,00 %



CTBP+
CERTIFIÉ PAR FCBA
PRODUITS PRÉSERVATION BOIS
N° Certificat 502-21-2168

UN 3267

Recomendaciones para casos de intoxicación o accidente:

EN CASO DE INHALACIÓN: Salga al aire libre y manténgase en reposo en una posición cómoda para respirar. Si hay síntomas: Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica. Si no hay síntomas: Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuague la boca inmediatamente. No induzca el vómito. Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lave la piel inmediatamente con abundante agua. A partir de entonces, quítese toda la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. Continúe lavando la piel con agua durante 15 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague inmediatamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante al menos 15 minutos. Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica. **NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO. SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Teléfono 91 562 04 20**

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

La dilución con agua o leche es apropiada si no se ha producido el vómito (adultos de 120- 240 ml, niños no exceder de 120 ml). Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana. Valorar la realización de endoscopia. En caso de metahemoglobinemia severa, administrar Azul de Metileno al 1%. Antídoto: EDTA, BAL (Dimercaprol) o D-Penicilamina. Tratamiento sintomático y de soporte.

Aplicaciones y Usos Autorizados:

Tratamiento de la madera en instalaciones industriales. Clase de riesgo 4 (madera sometida a humidificaciones permanentes o casi permanentes). Exclusivamente por personal profesional especializado.

ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA.

Modo de empleo para uso por personal especializado:

Aplicar el producto en la madera a tratar mediante autoclave, respetando los tiempos de contacto. No puede aplicarse en madera destinada a estar en contacto con alimentos/piensos o personas. Este producto no podrá aplicarse sobre madera cuyo destino sea la fabricación y uso de envases para contener alimentos/piensos. La madera recién tratada ha de almacenarse tras el tratamiento, a cubierto o en una superficie dura e impermeable o de ambos modos para evitar pérdidas directas al suelo o al agua. Cumple la Norma EN 47: Determinación del umbral de eficacia contra larvas de Hyloterpes bajulus junto con pruebas de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN 84. Cumple la norma EN-113: Determinación del umbral de eficacia contra hongos basidiomicetos xilófagos con Coriolus vesicular, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación EN73 y por deslavado según EN84. Cumple la norma UNE-EN 117: Determinación del umbral de eficacia contra termitas del género Reticulitermes junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN84. Cumple la norma UNE-EN 807: Determinación de la eficacia respecto de microorganismos de pudrición blanda y de otros microorganismos del suelo con ensayos de envejecimiento por deslavado según EN84. Ensayo de campo EN252: Eficacia frente a pudriciones de madera enterrada.

Plazo de seguridad recomendado: 24 horas, no será nunca inferior al tiempo que tarde en fijarse el producto.

Precauciones: No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. Ventilase adecuadamente el recinto donde se realiza la aplicación del producto. No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.



FROSCHÉMIE
FROSCHÉMIE WOOD PROTECTION

impra®
we care for wood